

Torbiele Jajników

Każda kobieta po 20 rż powinna mieć już za sobą chociaż jedno badanie USG narządu rodneho. Dzięki badaniu USG można bardzo szybko zdiagnozować wiele chorób, nieprawidłowości, dzięki czemu każda kobieta może zawniasu w pełni dbać o swoja kobiecość. Wiele kobiet usłyszało od lekarza wykonującego badanie USG diagnozę: torbiele jajników.

Czym są? Czy trzeba się bać?

Torbiel jest wypełnioną płynem surowicznym, krwią bądź inną zawartością "otorbioną" zmianą na jajniku. Może występować pojedynczo lub w towarzystwie innych torbieli. Najczęstszą przyczyną tworzenia się torbieli są zaburzenia hormonalne. Podczas prawidłowego cyklu miesięczkowego w jajniku dojrzewa pęcherzyk jajnikowy (Graffa), który w okresie okołoowulacyjnym pęka i wydobywa się z niego komórka jajowa. W przypadku zaburzeń hormonalnych pęcherzyk może nie pęknąć, lecz cały czas wzrastać i wypełniać się płynem surowicznym doprowadzając do powstania tzw. torbieli czynnościowej. Niektóre torbiele wymagają leczenia środkami hormonalnymi, a nawet antybiotykami i środkami przeciwzapalnymi. Torbiele o dużych rozmiarach lub podejrzanym charakterze wymagają operacyjnego usunięcia. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie, podjęcie leczenia oraz pozostawanie pod stałą opieką ginekologiczną

Większość torbieli to zmiany o charakterze łagodnym, lecz niektóre z nich mogą być zmianą złośliwą. Objawami torbieli są między innymi: ból i uczucie rozpierania w dole brzucha, ból podczas stosunków płciowych, nieregularne miesiączki, plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe, ból podczas oddawania moczu lub stolca. Warto więc o każdym nietypowym bólu podbrzusza poinformować ginekologa, wykonać badanie USG narządu rodneho, a w sytuacji, gdy wykryto u nas torbiele na jajnikach powtarzać badanie USG co pół roku.

Zapraszamy do [lekarzy ginekologów w CMP](#) i na badania USG.

[Zespół redakcyjny CMP](#)

