

## Ginekologia - KŁYKCINY KOŃCZYSTE



Bywają nazywane brodawkami narządów płciowych, należą do schorzeń wywoływanych przez wirus brodawczaka ludzkiego. Zaczyna być to coraz częstsza choroba weneryczna kobiet. Wnikanie wirusa następuje drogą płciową, przez każdy typ kontaktu seksualnego. Warto więc stosować prezerwatywy, gdyż zmniejszają one ryzyko zachorowania o ponad 75%.

### Objawy:

Pierwsze pojawiają się 2 do 3 miesięcy po stosunku z osobą zarażoną. To płaskie lub wypukłe brodawki w kolorze skóry. Z reguły są małe, ale mogą się zlewać w bardzo duże narośla. Umiejscawiają się na zewnętrznych i wewnętrznych narządach płciowych. U mężczyzn na żołędzi, kroczu, wokół odbytu, a nawet wewnątrz cewki moczowej.

Zazwyczaj nie wywołują swędzenia, bólu ani pieczenia. A wirus typu 6 i 11, który je wywołuje nie jest bezpośrednią przyczyną pojawienia się raka szyjki macicy.

---

## **Rozpoznanie:**

Lekarz ginekolog lub ogólny, rozpoznaje kłykciny na podstawie zwykłego badania ogólnego. U kobiety zalecane jest badanie cytologiczne , które wykaże obecność lub brak nieprawidłowych komórek.

## **Leczenie:**

Zazwyczaj usuwa się je laserem, zamraża ciekłym azotem lub koaguluje. Jednak usunięcie objawów nie gwarantuje całkowitego wyleczenia z choroby. Kto raz zaraził się wirusem brodawczaka ludzkiego jest jego nosicielem do końca życia i nigdy nie wie kiedy objawy znów się pojawią.

Kłykciny kończyste są chorobą rozprzestrzeniającą się bardzo szybko. Jest częściej potykana u mężczyzn niż u kobiet. A jeśli pojawi się u kobiety w ciąży to jest bezpośrednim wskazaniem do cesarskiego cięcia.

[Zespół redakcyjny](#)

