

Zapalenie cewki moczowej



Zapalenie cewki moczowej to dosyć wstydlivy problem wielu ludzi. Choroba ta przenosi się drogą płciową i powodowana jest zazwyczaj zakażeniem wirusem dwoinką rzeżączki ale nie zawsze. Stan zapalny mogą powodować urazy mechaniczne lub środki chemiczne drażniące organy płciowe. Zapalenie cewki moczowej, możemy podzielić na dwa rodzaje: swoiste i nieswoiste. Zapalenie swoiste powodowane jest wirusem rzeżączki, a zapalenie nieswoiste, innymi czynnikami.

Choroba, w niektórych przypadkach, przechodzi zupełnie bezobjawowo. Do objawów zapalenia cewki moczowej należą, przede wszystkim, ból oraz nieznośne pieczenie podczas oddawania moczu. Ujście cewki moczowej podczas choroby jest zaczerwienione, pojawia się świąd oraz obrzęk. Często również, chorobie towarzyszy ropna wydzielina. Kobiety cierpiące na to schorzenie narzekają zazwyczaj na upławy.

Leczenie choroby jest bardzo ważne, nawet bez wyraźnych objawów, ponieważ nieleczone zapalenie cewki moczowej może rozprzestrzenić się na jądra, a u kobiet na narządy miednicy oraz błonę śluzową macicy, co w efekcie może pozbawić płodności. Podczas choroby ważne jest, aby całkowicie powstrzymać się od współżycia. Każdy przypadek wymaga wizyty u lekarza specjalisty, badania oraz podjęcia odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Powikłania występują bardzo rzadko w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu. Czasami, w niektórych przypadkach dochodzi jedynie do spadku samopoczucia, mdłości lub buli brzucha. Partner lub partnerka chorej osoby również powinna niezwłocznie, po zdiagnozowaniu choroby, udać się do lekarza specjalisty i poddać się badaniom, co może zminimalizować ryzyko nawrotu zapalenia cewki moczowej.

Nie bójmy się iść z tym wstydlwym problemem do lekarza specjalisty, ponieważ może to mieć dla nas tragiczne w skutkach konsekwencje!

[Zespół redakcyjny](#)

[Twój Lekarz - codziennie nowe artykuły medyczne](#)